Wisteria floribunda 'Ludwik Lawin'











ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY

Wisteria Glicynia

www.clematis.com.pl

Potwierdzona jakość – kupuj rośliny z etykietą z tym znakiem

Glicynie to jedne z najpiękniejszych pnączy, które zimują w naszym klimacie. Te długowieczne rośliny są uprawiane w Japonii od setek lat. Stamtąd zostały sprowadzone do Europy na początku XIX w. Ich główną ozdobą są wyjątkowo efektowne kwiaty zebrane w długie grona (do 60 cm) w kolorach: niebieskofioletowym, fioletowym, różowym lub białym - w zależności od odmiany. Równie atrakcyjne są duże, pierzastozłożone liście, często przebarwiające się na żółto jesienią. Pędy glicynii owijają się wokół podpór. Glicynia kwiecista (*Wisteria floribunda*) ma pędy lewoskrętne (Fot. 1), a glicynia chińska (*Wisteria sinensis*) prawoskrętne (Fot. 2).


Fot. 1


Fot. 2

Glicynia kwitnie obficie w maju, ale może powtórzyć kwitnienie również latem. Rośliny rozmnażane z nasion rozpoczynają kwitnienie w 8.-12. roku i mogą kwitnąć słabo. Odmiany rozmnażane wegetatywnie przez sadzonki, w zależności od odmiany, mogą rozpocząć kwitnienie w 2.-5. roku i kwitnąć bardzo obficie. Aby wspomóc kwitnienie glicynii należy ją odpowiednio formować (pędy prowadzone poziomo kwitną najokazalej) oraz regularne przycinać.

Glicynia najlepiej rośnie i kwitnie na stanowiskach osłoniętych, ciepłych i słonecznych, glebie umiarkowanie żyznej i średnio wilgotnej, przepuszczalnej. Przez 3.-4. lata po posadzeniu wymaga szczególnie starannej pielęgnacji: podlewania, wiosennego nawożenia i osłaniania na zimę. Po stworzeniu solidnej podstawy rośnie silnie wytwarzając 1-3 m przyrostu rocznie, osiągając wysokość 10 m i więcej. Korzenie starych egzemplarzy mogą rozrastać się w promieniu kilkunastu metrów.

W ostre zimy glicynia może przemarzać (strefa mrozoodporności 6A-8), ale łatwo odbija z podstawy rośliny lub korzeni. Rośliny szczepione wypuszczają odrosty korzeniowe z podkładki (najczęściej siewki). Takie pędy są praktycznie nie do rozróżnienia i mogą zdominować całą roślinę, która zatraci swój główny walor w postaci kwitnienia. Z tego powodu w naszym klimacie zalecanie jest kupowanie odmian rozmnażanych wegetatywnie przez sadzonki (na własnych korzeniach).

Pnącze to wymaga mocnych podpór, które utrzymają jego dużą masę oraz nacisk silnie wijących się pędów. Glicynia idealnie nadaje się do prowadzenia przy kratownicach na południowych ścianach budynków, rozpinania na pergolach, trejażach, altanach, bramkach i innych konstrukcjach na słonecznych stanowiskach. Można je formować w drzewka i krzewy, a także uprawiać w pojemnikach, również jako bonsai.


Millettia japonica
VI-VII 25-35 cm
2-2,5 m ❄6-8


Wisteria 'Anwen'
V-VI 35-50 cm 5 m ❄6-8


Wisteria brachybotrys 'White Silk'
V-VI 15 cm 5 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Blue Dream'
V-VI 15 cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Domino'
V-VI 35 cm 4-5 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Honbeni'
V 35 cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Kuchi-beni'
V 25 cm 6-10 m ❄ 6-8


Wisteria floribunda 'Ludwik Lawin'
V 30 cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Multijuga'
V 40-80 cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Murasaki-noda'
V 35 cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Royal Purple'
V-VI 35-45cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Shiro-noda'
V 35-cm 6-8 m ❄6-8


Wisteria floribunda 'Violacea Plena'
V 35-cm 6-10 m ❄6-8


Wisteria frutescens 'Longwood Purple'
V-VI 10-20 cm 5 m ❄5-9


Wisteria macrostachya 'Blue Moon'
VI-VII 15-30 cm 5 m ❄4-9


Wisteria sinensis 'Amethyst'
V 20-25 cm 6 m ❄6-8


Wisteria sinensis 'Blue Sapphire'
V 20-25 cm 6 m ❄6-8


Wisteria sinensis 'Prolific'
V 25 cm 6 m ❄6-8


Wisteria sinensis 'Southern Belle'
V 20 cm 6 m ❄6-8


Wisteria sinensis 'Texas White'
V 25-35 cm 5 m ❄6-8

CIĘCIE

W pierwszych latach po posadzeniu glicynia rośnie wolno i nie wymaga przycinania. Należy pozwolić jej swobodnie rosnąć, aby się wzmocniła. W 3.-5. roku, po ukorzenieniu, zaczyna rosnąć silnie i wytwarzać 1-2 m przyrostu rocznie. Systematyczne cięcie pozwoli nadać roślinie pożądany kształt, osłabi wzrost wegetatywny i spowoduje obfitsze kwitnienie. Glicynię formujemy prowadząc główne pędy po podporze, w miarę możliwości poziomo i przycinając pędy boczne, co pobudza je do zawiązywania pąków kwiatowych. Miejsca cięcia należy zabezpieczyć pastą Santar lub Funaben.

W naszych warunkach klimatycznych, w maju, tuż po kwitnieniu, gdy widać, które z pędów zamarły po zimie, wykonujemy cięcie oczyszczające roślinę. Należy wyciąć wszystkie zamarłe, silnie uszkodzone, słabe i nadmiernie zagęszczające pędy, aby zapewnić pozostałym pędom równomierny dostęp do światła i poprawić przewietrzanie rośliny (Rys.1). Elastyczne pędy rozprowadzamy na boki.

Rys. 1




Pąki kwiatowe zawiązywane są wczesną jesienią, dlatego podstawowe cięcie wykonuje się latem na przełomie lipca i sierpnia. Glicynię powinno się wtedy ponownie prześwietlić, wycinając pędy nadmiernie zagęszczające i cienkie, a pozostałe nowe przyrosty przycinając nad 4 -5 liściem (Rys.2).

Rys. 2




Kolejne cięcie wykonujemy w stanie bezlistnym w III (Rys.3). Wycinamy pędy zamarłe i nadmiernie zagęszczające roślinę. Zeszłoroczne przyrosty przycinamy powtórnie, nad drugim pąkiem kwiatowym (pąki kwiatowe są pękate).

Rys. 3



Jeśli mimo regularnego cięcia przez kilka lat glicynia nie zakwitnie wskazane jest przycięcie korzeni, które może wywołać kwitnienie w następnym roku. Korzenie tniemy w III wbijając szpadel pionowo i możliwie głęboko dookoła rośliny w odległości 1,5-2 m od jej podstawy (Rys.4).

Rys. 4



Clematis® ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY
LAUREAT KONKURSU TERAZ POLSKA
Książka w formie wideo! PORADY FILMOWE na naszej stronie internetowej i w serwisie YouTube
www.clematis.com.pl

❀ pachnące kwiaty
V termin kwitnienia
25 cm długość kwiatostanu
4 m wysokość roślin
❄ 4-8 strefa mrozoodporności